



# Нольпаза®

таблетки 20 мг, 40 мг

пантопразол



**МАХ ЭФФЕКТА – МІН ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ!<sup>1,2</sup>**

МАХ – максимум; МІН – минимум.

**Источники информации:** 1. Лазебник Л.В., Бордин Д.С., Абдулхаков Р.А. и др. Эффективность пантопразола (Нольпаза®) при однократном утреннем приеме 40 мг у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью: исследование PAN-STAR // Consilium Medicum. 2013. No 15(8). С. 24-29. 2. Исаков В.А. Лекарственные взаимодействия ингибиторов протонной помпы: обновленные данные, Best clinical practice. 12.2014- №2. 3. Drug interactions with grapefruit juice. The Medical Letter 2004; 46 (1173): 2-4.



**KRKA**

## Интересный факт!

**Грейпфрутовый сок** способен в значительной степени влиять на фармакокинетику ряда лекарственных препаратов.<sup>3</sup>

Например при совместном применении с :

МНН	ЭФФЕКТ
Варфарин	Усиление антикоагулянтного эффекта
Нифедипин	Повышенный риск токсичности
Кармабазепин	Возможная токсичность
Циклоспорин	Возможная токсичность

Также установлено, что наибольший риск лекарственных взаимодействий среди ИПП\* имеется у ОМЕПРАЗОЛА, что обусловлено его высоким сродством к цитохрому CYP2C19 и 3A4B.<sup>2</sup>  
Например при совместном применении ОМЕ\*\* с :

МНН	ЭФФЕКТ
Варфарин	Снижение клиренса
Нифедипин	Повышение всасывания Снижение клиренса
Кармабазепин	Снижение клиренса
Циклоспорин	Противоречивые данные

НАИМЕНЬШИЙ РИСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ У ПАНТОПРАЗОЛА (НОЛЬПАЗА®),  
что подтверждено подробными клиническими и лабораторными данными.<sup>2</sup>

\*ИПП – ингибитор протонной помпы      \*\*ОМЕ – омепразол

Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников.



Заказчик размещения рекламы ООО «КРКА ФАРМА»  
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1.  
Тел.: (495) 981-10-95, факс: (495) 981-10-91. E-mail: info.ru@krka.biz, www.krka.ru