

ИЛОПРОСТ

Фармасинтез


Илопрост

Раствор для ингаляций 10 мкг/мл

Ингаляционный

илопрост для лечения

ЛАГ¹ и ХТЭЛГ²



РУ: ЛП-007981. Илопрост-Фармасинтез. МНН: Илопрост. Лекарственная форма: раствор для ингаляций. **Фармакотерапевтическая группа:** Антиагрегантное средство. **Код АТХ:** B01AC11. **Показания к применению:** Лечение среднетяжелой и тяжелой стадии легочной гипертензии в следующих случаях: идиопатическая (первичная) артериальная легочная гипертензия, семейная артериальная легочная гипертензия; артериальная легочная гипертензия, обусловленная заболеванием соединительной ткани или действием лекарственных средств или токсинов; легочная гипертензия вследствие хронических тромбозов и/или эмболий легочной артерии при отсутствии возможности хирургического лечения. **Противопоказания:** патологические состояния, при которых воздействии препарата Илопрост-Фармасинтез на тромбоциты может повысить риск кровотечения (в т.ч. язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, травма, внутричерепное кровоизлияние); тяжелая ишемическая болезнь сердца или нестабильная стенокардия; инфаркт миокарда в предыдущие 6 месяцев; декомпенсированная сердечная недостаточность при отсутствии надлежащего врачебного контроля; тяжелые аритмии; подозрение на застой крови в легких; цереброваскулярные осложнения (в т.ч. транзиторная ишемическая атака, инсульт) в предыдущие 3 месяца; легочная гипертензия вследствие легочной вено-окклюзионной болезни; Врожденные или приобретенные пороки клапанов сердца с клинически значимыми нарушениями функции миокарда, которые не обусловлены легочной гипертензией. Повышенная чувствительность к илопросту или другим компонентам препарата. Дети и подростки до 18 лет (в связи с тем, что опыт применения ограничен). **С осторожностью:** нарушения функции печени и почечная недостаточность у пациентов, нуждающихся в проведении диализа; артериальная гипотензия; ХОБЛ; тяжелая бронхиальная астма. **Применение во время беременности и в период грудного вскармливания:** Женщины, страдающие легочной гипертензией, должны избегать наступления беременности, так как это может привести к угрожающему жизни обострению болезни. **Способ применения и дозы:** Препарат Илопрост-Фармасинтез используется для длительной терапии. Готовый к применению раствор применяется через соответствующий прибор для ингаляций (небулайзер). Предшествующую терапию следует скорректировать в соответствии с индивидуальными потребностями пациента (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия»). **Рекомендуемые дозы:** Взрослые. В начале лечения препаратом Илопрост-Фармасинтез первая ингаляционная доза илопроста должна составлять 2,5 мкг (доза, доставляемая через мундштук ингалятора). Если пациент переносит лечение хорошо, дозу илопроста следует увеличить до 5 мкг и поддерживать эту дозу при последующих ингаляциях. В случае плохой переносимости следует вернуться к дозе 2,5 мкг. Ингаляции илопроста следует проводить от 6 до 9 раз в день в соответствии с индивидуальной потребностью пациента и переносимостью препарата. В зависимости от требуемой дозы препарата, доставляемой через мундштук, и типа небулайзера продолжительность сеанса ингаляции составляет примерно от 4 до 10 мин. **Форма выпуска:** Раствор для ингаляций 10 мкг/мл. По 2 мл в ампулы из бесцветного стекла. По 6 ампул с препаратом в 1 или 5 контурных пластиковых подложках. Условия хранения: при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. **Срок годности:** 2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке. **Условия отпуска.** Отпускают по рецепту. **Производитель:** АО «Фармасинтез», Россия. Юридический адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красногвардейская, д. 23, офис 3. Адрес производственной площадки: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург 184. **Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей:** АО «Фармасинтез», Россия, г. Иркутск ул. Р. Люксембург, д.184, Тел: 8-800-100-1550 Адрес электронной почты: info@pharmasyntez.com www.pharmasyntez.com. Подробная информация содержится в инструкции по применению.

1. ЛАГ - легочная артериальная гипертензия

2. ХТЭЛГ — хроническая тромбозэмболическая легочная гипертензия

Реклама.

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ТОЛЬКО В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК, СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ И ИНЫХ ПОДОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Ингаляционный илопрост для лечения ЛАГ¹ и ХТЭЛГ²




Показания к применению³

Лечение среднетяжелой и тяжелой стадии легочной гипертензии в следующих случаях:

- идиопатическая (первичная) артериальная легочная гипертензия, семейная артериальная легочная гипертензия;
- артериальная легочная гипертензия, обусловленная заболеванием соединительной ткани или действием лекарственных средств или токсинов;
- легочная гипертензия вследствие хронических тромбозов и/или эмболий легочной артерии при отсутствии возможности хирургического лечения.

Схема приема³



1. ЛАГ- легочная артериальная гипертензия

2. ХТЭЛГ- хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия

3. Инструкция по медицинскому применению препарата Илопрост-Фармасинтез АО «Фармасинтез» (РУ: ЛП-007981)

Дальтеп

Далтепарин Натрия

Раствор для внутривенного и подкожного введения

2500 Анти-Ха МЕ/0,2 мл

5000 Анти-Ха МЕ/0,2 мл

На 52% снижает риск развития повторных ВТЭО¹
у онкологических пациентов по сравнению
с пероральной антикоагулянтной терапией²

Может применяться:

- у пациентов с тяжелой острой и хронической почечной недостаточностью³
- продолжительно до 6 месяцев³
- в условиях стационара и в амбулаторных условиях³



¹ ВТЭО- венозные тромбоэмболические осложнения

² Исследование CLOT. Lee AY et al. N Engl J Med 2003; 349: 146-153

³ Инструкция по медицинскому применению препарата Дальтеп

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии от потребителей
АО «Фармасинтез», 664040, Россия, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.184

8 800 100-15-50

pharmasyntez.com

для получения более полной информации необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Профилактика тромбообразования при проведении операций в хирургической практике у пациентов со злокачественными опухолями¹



В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА¹



в реанимации



ОРИТ



в палатном отделении

	Начало профилактики	10-14 часов до операции	За 2 часа до операции	8-12 часов после операции	Послеоперационный период . В течение всего периода постельного режима	
	В день проведения операции		2500 МЕ п/к	2500 МЕ п/к	5000 МЕ 1 раз п/к каждое утро	
	Вечером накануне операции	5000 МЕ п/к			5000 МЕ 1 раз п/к каждый вечер	

Длительное лечение с целью предотвращения рецидива ВТЭО² у пациентов со злокачественными новообразованиями¹



В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Определение дозы далтепарина натрия в зависимости от массы тела для периода лечения:

Доза Дальтепа, МЕ	7 500	10 000	12 500	15 000	18 000	
1-й месяц 200 МЕ/кг п/к 1 раз в сутки						
Масса тела (кг)	< 46	46-56	57-68	69-82	≥ 83	
2-6-й месяц около 150 МЕ/кг п/к 1 раз в сутки						
Масса тела (кг)	≤ 56	57-68	69-82	83-98	≥ 99	

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Дальтеп.
2. ВТЭО- венозные тромбоэмболические осложнения.