ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КАРДИОЛОГОВ

КАРДИОНЕФРОЛОГИЯ 2019

27 НОЯБРЯ 2019 Г.,
МОСКВА

ПРОГРАММА

WWW.CARDIO-EUR.ASIA

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

27 ноября 2019 г.

09.00-10.00	Регистрация участников. Открытие выставки
10.00	Открытие конференции Председатели: академик Чазова И.Е., Ощепкова Е.В.
10.00-10.05	Приветствие, вступительное слово кардиолога
10.05-10.30	Ощепкова Е.В., Аксенова А.В. Гипертоническая болезнь и почки
10.30-10.50	Чихладзе Н.М. Хроническая болезнь почек и АГ при поражении надпочечников
10.50-11.10	Жернакова Ю.В. Гиперурикемия как фактор риска кардиоваскулярных заболеваний – новый взгляд на старую проблему
11.10-11.30	Миронова О.Ю. Острый коронарный синдром и хроническая болезнь почек
11.30-12.00	Перерыв. Кофе-брейк
	Председатели: Котенко О.Н., Шило В.Ю.
12.00-12.05	Приветствие, вступительное слово нефролога
12.05-12.35	Котенко О.Н. Реализация междисциплинарного подхода в комплексном лечении пациентов с ХБП в г. Москве
12.35-12.50	Шило В.Ю. Особенности поражения сердечно-сосудистой системы у пациентов с минерально-костными нарушениями на гемодиализе *(доклад при поддержке компании Сотекс; не участвует в НМО, баллы не начисляются)*
12.50-13.10	Миронова О.Ю. Контраст-индуцированная нефропатия в практике кардиолога
13.10-13.30	Козловская Н.Л. Злокачественная артериальная гипертония и почки
13.30-13.50	Елфимова Е.М. Синдром обструктивного апноэ сна и патология почек: двунаправленная связь
13.50-14.10	Насонова С.Н., Жиров И.В., Терещенко С.Н. Острое почечное повреждение у пациентов с декомпенсацией сердечной недостаточности: пути решения проблемы
14.10-14.30	Ответы на вопросы. Дискуссия

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР

СОТЕКС

ПАРТНЕРЫ

Р-ФАРМ
Инновационные технологии здоровья

EGIS

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

СООБЩЕСТВО «ВРАЧИ РФ»

ООО «ММА«МЕДИАМЕДИКА»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Центральный Дом журналистов,
Москва, Никитский бульвар, д. 8 а,
от метро Арбатская 8 мин. пешком

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон: 8-495-414-62-70
E-mail: info-cardio@cardio-eur.asia
www.cardio-eur.asia

Аллопуринол-ЭГИС

аллопуринол 100 мг N50, 300 мг N30

Лидер* среди препаратов для снижения мочевой кислоты в крови[1]

Целевой уровень МК[2]:
<360 мкмоль/л (или <6 мг/дл)
<300 мкмоль/л (или <5 мг/дл)
у сердечно-сосудистых больных

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Аллопуринол-ЭГИС
Регистрационное удостоверение П № 012684/01. **Торговое название:** Аллопуринол-ЭГИС. **Международное непатентованное название:** аллопуринол. **Фармакотерапевтическая группа:** противоподагрическое средство – ксантиноксидазы ингибитор. **ПОКАЗАНИЯ.** Подавление образования мочевой кислоты и ее солей при подтвержденном накоплении этих соединений (например, подагрический артрит, кожные тофусы, нефролитиаз) или предполагаемом клиническом риске их накопления. К основным клиническим состояниям, которые могут сопровождаться накоплением мочевой кислоты и ее солей, относятся: идиопатическая подагра; мочекаменная болезнь (образование конкрементов из мочевой кислоты); острая мочекислая нефропатия; опухолевые заболевания и миелопролиферативный синдром с высокой скоростью обновления клеточной популяции, когда гиперурикемия возникает спонтанно или после проведения цитотоксической терапии; определенные ферментативные нарушения, сопровождающиеся гиперпродукцией солей мочевой кислоты. Лечение мочекаменной болезни, сопровождающейся образованием 2,8-дигидроксиадениновых (2,8-ДГА) конкрементов в связи с пониженной активностью аденинфосфорибозилтрансферазы. Профилактика и лечение мочекаменной болезни, сопровождающейся образованием смешанных кальциево-оксалатных конкрементов на фоне гиперурикозурии, при неэффективности диетотерапии и повышенного потребления жидкости. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.** Гиперчувствительность к аллопуринолу или любому из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата. Печеночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность (стадия азотемии), острый приступ подагры, детский возраст до 3-х лет, беременность, период грудного вскармливания. Непереносимость лактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции (в состав препарата входит лактозы моногидрат). **С ОСТОРОЖНОСТЬЮ.** При нарушении функции печени, гипотиреозе, сахарном диабете, артериальной гипертензии, первичном гемохроматозе, одновременном приеме ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента или диуретиков, детский возраст, пожилой возраст, нарушение функции почек. **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.** Наблюдаемые в пострегистрационном периоде нежелательные реакции, связанные с терапией аллопуринолом, встречаются редко или очень редко. В общей популяции пациентов в большинстве случаев носят легкий характер. Частота развития нежелательных явлений увеличивается при нарушениях функций почек и (или) печени. *Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:* частые: сыпь; у пациентов, принимающих аллопуринол, наиболее распространены нежелательные реакции со стороны кожи. На фоне терапии препаратом эти реакции могут развиваться в любое время. Кожные реакции могут проявляться зудом, макулопапулезными и чешуйчатыми высыпаниями. При развитии подобных реакций терапию аллопуринолом необходимо немедленно прекратить. Если реакция со стороны кожи носит легкий характер, то после исчезновения этих изменений можно возобновить прием аллопуринола в меньшей дозе (например, 50 мг в сутки). Впоследствии дозу можно постепенно увеличить.
Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами:
Пациенты, принимающие препарат, не должны управлять транспортными средствами и механизмами до тех пор, пока они не будут уверены в том, что аллопуринол не оказывает неблагоприятного влияния на соответствующие способности. **КОД АТХ:** М04АА01.

Перед применением необходимо ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению препарата

* по продажам в упаковках и деньгах по данным IQVIA, Россия, июнь 2019
1. Инструкция по медицинскому применению препарата Аллопуринол-ЭГИС
2. Cardiology Journal 2018, Vol. 25, No. 5: 558

Реклама ALP_adv_08/2018

Организация, принимающая претензии потребителей: ООО «ЭГИС-РУС» 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Тел: (495) 363-39-66, факс: (495) 789-66-31, e-mail: moscow@egis.ru, www.egis.ru

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ